



Merkblatt

Windpocken

(Varizellen, wilde Blattern, Wasserpocken)



Allgemeines

Äusserst ansteckende virale Infektionskrankheit.

Erreger

Varicella-Zoster-Virus (VZV), Windpockenvirus aus der Familie der Herpesviren.

Übertragung

Die Ansteckung erfolgt durch direkten Kontakt mit den Körpersekreten oder Bläschenflüssigkeit der erkrankten Person, häufiger jedoch durch die hoch ansteckenden Tröpfchen beim

Niesen, Husten und Sprechen. Das Virus ist weltweit verbreitet und ausgesprochen kontagiös, so dass über 95% der Personen mit diesem Virus angesteckt sind. Einige Tage vor Erkrankungsbeginn und bis zum

Verkrusten der Bläschen ist die Krankheit übertragbar.

Inkubationszeit

Die Zeit zwischen Ansteckung und Krankheitsbeginn beträgt 10 bis 21 Tage.

Krankheitszeichen

Die ersten Anzeichen sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Nach 1 bis 2 Tagen treten juckende, rote, erhabene Flecken auf, die schubweise auftreten und sich über den ganzen Körper, Kopfhaut und die Schleimhäute ausbreiten. Davon ausgenommen sind Handflächen und Fusssohlen. Diese Papeln bilden schliesslich stark juckende und mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, worin das hoch ansteckende Virus enthalten ist. Diese Bläschen verkrusten langsam, die Beschwerden bestehen jedoch über ca. 10 Tage.

Diagnose

Durch den charakteristischen Ausschlag ist die Diagnose schnell zu stellen.

Behandlung

Juckreiz stillende Mittel können auf den Ausschlag aufgetragen werden. Dies ist wichtig, um den Juck-

reiz zu lindern, denn häufiges Kratzen der juckenden Stellen kann eine bakterielle Infektion verursachen. Deshalb ist bei Kindern zusätzlich zu empfehlen, die Fingernägel kurz zu schneiden und sauber zu halten, sowie bei sehr kleinen Kindern das Aufkratzen durch z. B. Baumwollhandschuhe zu verhindern.

Verlauf/Prognose

Die Krankheit heilt normalerweise innerhalb 7 bis 10 Tagen problemlos ab. Sie hinterlässt eine lebenslange Immunität gegenüber Windpocken. Dieses Virus kann sich jedoch auch ein Leben lang in Nervenzellen etablieren und nach einer Zeit eine Zweiterkrankung genannt Gürtelrose (Herpes Zoster) hervorrufen. Diese Gürtelrose ist also keine Neuerkrankung, sondern ein Rückfall, sozusagen aus dem Innern erzeugt, und setzt eine früher durchgemachte Windpockenerkrankung voraus. An Gürtelrose erkrankte Personen können ebenfalls das Varicella-Zoster-Virus verbreiten.

Vorbeugung

Kontakt meiden mit Perso-

nen, die an Windpocken erkrankt sind, was insbesondere für Säuglinge in den ersten vier Lebenswochen, schwangeren Frauen und Personen mit einer Immunschwäche gilt. Es gibt eine Schutzimpfung, welche für Personen von 11 bis 38 Jahren empfohlen wird, welche die Windpocken nicht durchgemacht haben. Je älter die Person ist, desto schwerer ist der Verlauf der Erkrankung und desto höher das Risiko von auch schweren Komplikationen. Frauen, welche die Erkrankung nicht durchgemacht haben und schwanger werden wollen, sollten sich impfen lassen. Das Virus kann das werdende Kind schädigen und ein sogenanntes «kongenitales Varzellensyndrom» verursachen mit schweren Hautveränderungen, Missbildung der Gliedmassen, grauen Star, Hirnmissbildungen etc.

Schulbesuch

Der Allgemeinzustand des betroffenen Kindes ist massgebend für den Schulausschluss. Wichtig ist eine Information der Eltern von Kindern mit einer Immunschwäche.