



Verzeichnis der ohne ärztliche Verordnung anzuwendenden Arzneimittel durch die Hebammen

Der Kanton Zürich bestimmt aufgrund von Art. 52 Abs. 3 der Verordnung über die Arzneimittel (VAM, SR 812.212.21) die nachfolgend aufgeführten Arzneimittel für die **Anwendung** durch diplomierte Hebammen (Bachelor of Science FH in Hebamme) im Rahmen ihrer Berufsausübung. Hebammen, die über eine Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung verfügen, dürfen die Arzneimittel dieser Liste ohne ärztliche Verordnung **anwenden**.

Therapeutische Gruppe	Arzneimittel (Wirkstoff)	Indikation
Analgetikum	Tramadol, (z.B. Tramal®, Tramadol-Mepha®) Amp. 100mg, Supp. 100mg	Wehenschmerzen
Antihypotonikum	Ephedrin Amp. 50mg/10ml unverdünnt anwenden 50mg/ml verdünnt anwenden	Hypotonie i.v. 50mg/10ml in Schritten zu 5mg/ml
Antikonvulsivum	Diazepam (z.B. Valium®, Stesolid®-Novum) Amp. 10mg	Krampfprophylaxe bei drohender Eklampsie
Antimykotische Salben / Gels	Multilind® Heilpaste Clotrimazolium (z.B. Canesten®) Creme Dakarin® Mundgel	Soorbehandlung bei Säuglingen und bei Müttern
Desinfektionsmittel		Haut- und Schleimhautdesinfektion
Einläufe		Darmreinigung vor Geburt
Immunglobulin	Anti-D-Immunglobulin (Rhophylac®) 300µg	Prophylaxe der Rhesusimmunisierung
Infusionslösungen	NaCl 0.9%, Ringer-lactat, Glucose 5% Hydroxyethylstärke (130/0.4) Voluven®, Hemohe® 6% NaCl 0.9% Kurzinfusion 100ml	Volumenersatz Volumenersatz (max. 1000ml) als Trägerlösung
Injektionslösungen	NaCl 0.9% Amp. 10ml	als Trägerlösung
Kortikosteroide	Methylprednisolon (Solu-Medrol® 125mg)	schwere allergische Reaktion
Lokalanästhetikum	Lidocain 1% Amp. 10ml	Dammschnitt, Risswunden
Spasmolytikum	Scopolaminbutylbromid (Buscopan®) Amp. 20mg, Supp. 10mg	rigider Muttermund; Achtung Tachykardie bei i.v. Gabe; deshalb keine i.v. Anwendung nach PDA, bei schweren variablen Dezelerationen im CTG und innerhalb von 30 Min. nach Gabe von Gynipral®
Tokolytikum	Hexoprenalin (Gynipral®) Amp. 10mcg	Wehenüberaktivität, Nabelschnurvorfal
Uteruskontrahierende Substanzen	Oxytocin (Syntocinon®) Amp. 5 IE Oxytocin (Syntocinon®) Nasenspray Misoprostol* (Cytotec®) Tabl 200µg *off-label use, Einsatz gemäss PPH-KONSENSUS-Gruppe (D-A-Ch) 2011	zur Lösung der Nachgeburt Förderung der Milchentleerung 800µg rectal oder peroral bei postpartaler Blutung und Uterusatonie mit 500ml Blutverlust

Therapeutische Gruppe	Arzneimittel (Wirkstoff)	Indikation
-----------------------	--------------------------	------------



Kanton Zürich
Kantonale Heilmittelkontrolle



Merkblatt

Stand April 2019
MKB-40706A

Vitamin K

Phytomenadion (Konaktion® MM
paediatric) Amp. 2mg

Prophylaxe von Hämorrhagien bei Neugeborenen

Hinweis:

Im Internet finden Sie unter www.heilmittelkontrolle.zh.ch weitere Informationen, Unterlagen und Merkblätter.